

成都市 2020 级高中毕业班第三次诊断性检测

数学(文科)参考答案及评分意见

第 I 卷 (选择题, 共 60 分)

一、选择题:(每小题 5 分,共 60 分)

1. C; 2. B; 3. A; 4. C; 5. A; 6. A; 7. B; 8. D; 9. C; 10. D; 11. B; 12. D.

第 II 卷 (非选择题,共 90 分)

二、填空题:(每小题 5 分,共 20 分)

13. $\frac{1}{2}$;

14. 81;

15. 10;

16. $\frac{3\sqrt{3}}{16}$.

三、解答题:(共 70 分)

17. 解:(I)由题得 $\bar{x} = \frac{1}{5}(9+9.5+10+10.5+11)=10$,1 分

$$\bar{y} = \frac{1}{5}(11+10+8+6+5)=8. \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\because \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -8, \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 2.5, \sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 26, \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\therefore r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{-8}{\sqrt{65}} \approx -0.99.$$

 $\because y$ 与 x 的相关系数近似为 -0.99, 说明 y 与 x 的线性相关性很强, 从而可以用线性回归模型拟合 y 与 x 的关系.6 分

(II) $\because \hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{-8}{2.5} = -3.2, \hat{a} = \bar{y} + 3.2\bar{x} = 40$,9 分

 $\therefore y$ 关于 x 的线性回归方程为 $\hat{y} = -3.2x + 40$10 分当 $x=8.5$ 时, $\hat{y}=12.8$. \therefore 当产品定价为 8.5 元时, 预测销量可达到 12.8 万件.12 分18. 解:(I)如图,设 P 是 CG 的中点,连接 PM, PN . $\because M$ 为 AC 的中点, $\therefore PM \parallel AG$.又 $PM \not\subset$ 平面 AGF , $AG \subset$ 平面 AGF , $\therefore PM \parallel$ 平面 AGF2 分同理可得, $PN \parallel$ 平面 AGF . $\because PM \cap PN = P$, $PM, PN \subset$ 平面 PMN , \therefore 平面 $PMN \parallel$ 平面 AGF5 分

又 $MN \subset$ 平面 PMN , $\therefore MN \parallel$ 平面 AGF .

.....6 分

(II) $\because FG \perp$ 平面 $ADGC$, $CG \subset$ 平面 $ADGC$,

$\therefore FG \perp CG$.

.....7 分


又 $CG \perp GD$, $GF \cap GD = G$, $GD \subset$ 平面 $DEFG$,

$GF \subset$ 平面 $DEFG$,

$\therefore CG \perp$ 平面 $DEFG$.

.....9 分

$\therefore BC = 1$, $\therefore FG = 2$, $EF = 1$, $CG = 2$.



$$\therefore V_{E-DFN} = V_{N-DEF} = V_{P-DEF} = \frac{1}{3} S_{DEF} \cdot \frac{1}{2} CG = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \cdot EF \cdot FG \cdot \frac{1}{2} \cdot CG = \frac{1}{3}.$$

\therefore 三棱锥 $E-DFN$ 的体积为 $\frac{1}{3}$12 分

19. 解:(I) $\because \sqrt{3}c + a = b \cos C - c \cos B$,

由正弦定理有 $\sqrt{3} \sin C + \sin A = \sin B \cos C - \sin C \cos B$,2 分

$\therefore \sin A = \sin(B+C)$,

$\therefore \sqrt{3} \sin C + \sin B \cos C + \sin C \cos B = \sin B \cos C - \sin C \cos B$4 分

$\therefore 2 \sin C \cos B + \sqrt{3} \sin C = 0$5 分

又 $C \in (0, \pi)$, $\therefore \sin C \neq 0$.

$$\therefore \cos B = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

又 $B \in (0, \pi)$, $\therefore B = \frac{5\pi}{6}$6 分

(II) 在 $\triangle BCD$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle BDC = \frac{BD^2 + CD^2 - BC^2}{2BD \cdot CD} = \frac{2b^2 - 9a^2}{2b^2}$.

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle BDA = \frac{BD^2 + AD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} = \frac{5b^2 - 9c^2}{4b^2}$.

$\therefore \angle BDC + \angle BDA = 180^\circ$, $\therefore \cos \angle BDC = -\cos \angle BDA$.

即 $\frac{2b^2 - 9a^2}{2b^2} = -\frac{5b^2 - 9c^2}{4b^2}$, 整理得 $b^2 - c^2 = 2a^2$9 分

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{则 } -\frac{a^2}{2ac} = -\frac{a}{2c} = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \therefore a = \sqrt{3}c.$$

$\therefore b^2 - c^2 = 6c^2$, 即 $b = \sqrt{7}c$11 分

$$\therefore \cos \angle BDA = \frac{5b^2 - 9c^2}{4b^2} = \frac{13}{14}. \quad \text{.....12 分}$$

20. 解:(I) 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 \neq x_2$.

由 $\begin{cases} y_1^2 = 4x_1 \\ y_2^2 = 4x_2 \end{cases}$, 得 $y_1^2 - y_2^2 = 4x_1 - 4x_2$. 化简得 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{4}{y_1 + y_2}$2 分

$$\therefore \sqrt{3} = \frac{4}{y_1 + y_2}, \text{ 即 } \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

\therefore 线段 PQ 中点纵坐标的值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 4 分

(Ⅱ) 设 y 轴上存在定点 $S(0, s)$, 由题意, 直线 MN 斜率存在且不为 0, 设直线 $MN : y = kx + s$, $P(\frac{y_1^2}{4}, y_1), Q(\frac{y_2^2}{4}, y_2), M(\frac{y_3^2}{4}, y_3), N(\frac{y_4^2}{4}, y_4)$.

由 $\begin{cases} y = kx + s, \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 消去 x , 得 $ky^2 - 4y + 4s = 0$.

$$\therefore \Delta = 16 - 16ks > 0, \therefore ks < 1.$$

$$\therefore y_3 + y_4 = \frac{4}{k}, y_3 y_4 = \frac{4s}{k}. \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$\because P, T, M$ 三点共线,

$$\therefore \frac{y_3 - 0}{\frac{y_3^2}{4} - \sqrt{3}} = \frac{y_1 - 0}{\frac{y_1^2}{4} - \sqrt{3}}. \text{ 解得 } y_1 y_3 = -4\sqrt{3}.$$

同理, 可得 $y_2 y_4 = -4\sqrt{3}$ 8 分

$$\text{又 } k_{PQ} = \frac{y_1 - y_2}{\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{4}} = \frac{4}{y_1 + y_2} = \frac{4}{-\frac{4\sqrt{3}}{y_3} + \frac{-4\sqrt{3}}{y_4}} = \frac{y_3 y_4}{-\sqrt{3}(y_3 + y_4)} = \sqrt{3}, \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{y_3 y_4}{y_3 + y_4} = \frac{\frac{4s}{k}}{\frac{4}{k}} = -3. \text{ 解得 } s = -3. \quad \dots\dots 11 \text{ 分}$$

\therefore 直线 MN 恒过定点 $(0, -3)$ 12 分

21. 解: (Ⅰ) 当 $a=0$ 时, $f(x) = -x \sin x$.

$$\therefore f'(x) = -(\sin x + x \cos x). \therefore f'(\pi) = \pi. \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

\therefore 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(\pi, 0)$ 处的切线方程为 $\pi x - y - \pi^2 = 0$ 4 分

(Ⅱ) 由题知 $f(x) = x(ax - \sin x)$, 不妨设 $g(x) = ax - \sin x$.

$$\therefore g'(x) = a - \cos x. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

(i) 当 $a \geq 1$ 时, 不妨设 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

$\because \cos x \in (0, 1)$, $\therefore g'(x) > 0$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上恒成立.

$\therefore g(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增. 6 分

又 $g(0) = 0$,

\therefore 当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $g(x) < g(0) = 0$; 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $g(x) > g(0) = 0$ 7 分

$\therefore f(x) = xg(x)$,

$$\therefore f'(x) = g(x) + xg'(x).$$

\therefore 当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上单调递减;

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增.

$\therefore x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点. 9 分

(ii) 当 $0 \leq a < 1$ 时, 不妨设 $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$.

$\therefore \exists x_0 \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $g'(x_0) = 0$, 且 $x \in (0, x_0)$, $g'(x) < 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减. 10 分

\therefore 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g(x) < g(0) = 0$.

\therefore 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) = g(x) + xg'(x) < 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $x \in (0, x_0)$ 上单调递减. 11 分

$\therefore x=0$ 不是函数 $f(x)$ 的极小值点.

综上所述, 当 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点时, a 的取值范围为 $[1, +\infty)$ 12 分

22. 解: (I) 由直线 l 的参数方程, 得直线 l 的普通方程为 $2x+3y-8=0$ 2 分

将 $\rho^2=x^2+y^2$, $\rho \sin \theta=y$ 代入曲线 C 的极坐标方程

化简得曲线 C 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 5 分

(II) 由(I), 设点 $P(2\cos\alpha, \sin\alpha)$ 6 分

由题知 $|PQ|$ 的最小值为点 P 到直线 l 的距离的最小值.

又点 P 到直线 l 的距离 $d=\frac{|4\cos\alpha+3\sin\alpha-8|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\frac{|5\sin(\alpha+\varphi)-8|}{\sqrt{13}}$, 其中 $\tan\varphi=\frac{4}{3}$.

.... 8 分

当 $\alpha+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi(k \in \mathbb{Z})$ 时, d 的最小值为 $\frac{3\sqrt{13}}{13}$.

$\therefore |PQ|$ 的最小值为 $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ 10 分

23. 解: (I) $\because f(1)=3$, $f(n)=3$, 且 $n>1$,

$\therefore 3+|1-m|=3$, 解得 $m=1$.

$\therefore f(x)=3|x-2|+|x-1|$ 2 分

$\therefore 3|n-2|+|n-1|=3$.

(i) 当 $1 < n \leq 2$ 时, 由 $3(2-n)+(n-1)=5-2n=3$, 解得 $n=1$ (不合题意, 舍去);

(ii) 当 $n > 2$ 时, 由 $3(n-2)+(n-1)=4n-7=3$, 解得 $n=\frac{5}{2}$, 经检验满足题意.

综上所述, $m=1$, $n=\frac{5}{2}$ 5 分

(II) 由(I)得 $m=1$. $\therefore a^2+b^2+c^2=1$.

$\therefore (\frac{a^4}{b^2+1}+\frac{b^4}{c^2+1}+\frac{c^4}{a^2+1})(a^2+1+b^2+1+c^2+1) \geq (a^2+b^2+c^2)^2$, 8 分

$\therefore \frac{a^4}{b^2+1} + \frac{b^4}{c^2+1} + \frac{c^4}{a^2+1} \geq \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$. 当且仅当 $\frac{a^4}{(b^2+1)^2} = \frac{b^4}{(c^2+1)^2} = \frac{c^4}{(a^2+1)^2}$, 即

$a=b=c=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立.

$\therefore \frac{a^4}{b^2+1} + \frac{b^4}{c^2+1} + \frac{c^4}{a^2+1} \geq \frac{1}{4}$.

.....10 分

