

遂宁市高中 2024 届零诊考试

数学 (文科) 试题参考答案及评分意见

一、选择题 (每小题 5 分, 12 小题, 共 60 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	C	A	B	B	C	A	D	C	B	D

二、填空题 (每小题 5 分, 4 个小题, 共 20 分)

13. $\sqrt{10}$ 14. 5 15. $\frac{3}{2}$ 16. $\{1011, 1012\}$

三、解答题

17. (1) $f(x) = 2\sqrt{3}\sin x \cos x - 2\sin^2 x = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x - 1 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$,3 分

因为 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以 $-\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi$,5 分

故函数 $y = f(x)$ 在单调增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right] (k \in \mathbb{Z})$;6 分

(2) 将 $f(x)$ 向左平移 m 个单位得到 $f_1(x) = 2\sin\left(2(x+m) + \frac{\pi}{6}\right) - 1$

将 $f_1(x)$ 纵坐标不变, 横坐标变为原来的两倍得到 $g(x) = 2\sin\left(x + 2m + \frac{\pi}{6}\right) - 1$,

又因为 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 $\frac{\pi}{3} + 2m + \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2}$,9 分

解得: $m = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,10 分

因为 $m > 0$, 所以当 $k = 1$ 时, $m = \frac{\pi}{2}$ 取得最小值,11 分

故 $g(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$ 12 分

18. 解: (1) 当 $n \geq 2$ 时, $S_{n-1} = (n-1)^2 - (n-1) + 1 = n^2 - 3n + 3$ 1 分

$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - n + 1 - (n^2 - 3n + 3) = 2n - 2$ 3 分

当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 1$ 4 分

故 $a_n = \begin{cases} 1, n = 1 \\ 2n - 2, n \geq 2 \end{cases} (n \in \mathbb{N}^*)$ 5 分

(2) $b_1 = \frac{1}{a_1 \cdot a_2} = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$ 6 分

当 $n \geq 2$ 时, $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n-2)2n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$ 8分

故 $T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$
 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4n}$ 10分

要使 $T_n \leq \frac{45}{64}$, 即 $\frac{3}{4} - \frac{1}{4n} \leq \frac{45}{64}$, 解得 $n \leq \frac{16}{3}$, 又 $n \in N^*$, 故 n 的最大值为 5.12分


19. (1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $\sin B = \cos B$, $B = \frac{\pi}{4}$ 1分

$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ah = \frac{1}{2} ac \sin B$, 则 $\frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \frac{1}{2} \times 3 \times c \times \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = \sqrt{2}$ 3分

又由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 5$, 所以 $b = \sqrt{5}$ 5分

所以 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ 6分

(2) 由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{3}{\sin A}$,



所以 $c = \frac{3 \sin C}{\sin A} = \frac{3 \sin \left(\frac{3\pi}{4} - A \right)}{\sin A} = \frac{3}{\sqrt{2}} \left(1 + \frac{1}{\tan A} \right)$ 8分

又因为锐角 $\triangle ABC$, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2}, \\ 0 < \frac{3\pi}{4} - A < \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 解得 $\frac{\pi}{4} < A < \frac{\pi}{2}$,

所以 $0 < \frac{1}{\tan A} < 1$ 9分

所以 $\frac{3}{\sqrt{2}} < c < \frac{6}{\sqrt{2}}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{3\sqrt{2}}{4} c \in \left(\frac{9}{4}, \frac{9}{2} \right)$ 11分

即 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是 $\left(\frac{9}{4}, \frac{9}{2} \right)$ 12分

20. (1) 若 $a = 2$, 则 $f'(x) = 3x^2 + 4x + 1 = (3x+1)(x+1)$

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x_1 = -1, x_2 = -\frac{1}{3}$ 2分

当 x 变化时, $f'(x), f(x)$ 的取值情况如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, -\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3}, +\infty)$
-----	-----------------	------	----------------------	----------------	---------------------------

$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	单调递增	极大值	单调递减	极小值	单调递增

且 $f(-2) = -1 < 0, f(-1) = 1 > 0, f(-\frac{1}{3}) = \frac{23}{27} > 0$ 4 分

根据零点存在定理可得： $f(x)$ 在 $(-2, -1)$ 有一个零点，

所以函数 $f(x)$ 的极大值为 1，极小值为 $\frac{23}{27}$ ，且 $f(x)$ 有 1 个零点.5 分

(2) 由题意知， x_1, x_2 是方程 $3x^2 + 2ax + 1 = 0$ 的两个不等实根，且 $x_1 < x_2, a^2 > 3$

由韦达定理知， $x_1 + x_2 = -\frac{2a}{3}, x_1 x_2 = \frac{1}{3}, x_1^2 + x_2^2 = \frac{4}{9}a^2 - \frac{2}{3}$,

$x_1 - x_2 = -\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = -\sqrt{\frac{4}{9}a^2 - \frac{4}{3}} = -\frac{2}{3}\sqrt{a^2 - 3}$ 8 分

所以 $f(x_1) - f(x_2) = (x_1^3 + ax_1^2 + x_1 + 1) - (x_2^3 + ax_2^2 + x_2 + 1)$

$= (x_1 - x_2) [(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) + a(x_1 + x_2) + 1]$ 9 分

$= -\frac{2}{3}\sqrt{a^2 - 3} \left(\frac{4}{9}a^2 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a^2 + 1 \right) = \frac{4}{27}(\sqrt{a^2 - 3})^3$ 10 分

其中 $a^2 > 3$

令 $t = \sqrt{a^2 - 3}$ ，则 $g(t) = \frac{4}{27}t^3, t > 0$ ，因为 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增11 分

所以 $f(x_1) - f(x_2)$ 的取值范围是 $(0, +\infty)$ 12 分

21. (1) $\because f(x) = ae^{3x} - x, \therefore f'(x) = 3ae^{3x} - 1$ 1 分

(i) 当 $a \leq 0$ 时，, 所以 $f(x)$ 在 R 上单调递减3 分

(ii) 当 $a > 0$ 时，令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = -\frac{\ln 3a}{3}$

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{\ln 3a}{3}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{\ln 3a}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增.....5 分

(2) 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) - h(x) = ae^{3x} - x - 3x^2 + x \ln x \geq e^{3x} - x - 3x^2 + x \ln x$

原命题 $\Leftarrow e^{3x} - x - 3x^2 + x \ln x > 0$, 即证 $\frac{e^{3x}}{x} - 1 > 3x - \ln x$,

即证 $e^{3x - \ln x} - 1 > 3x - \ln x$,7 分

令 $t = \varphi(x) = 3x - \ln x (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) = 3 - \frac{1}{x} = \frac{3x-1}{x}$,

当 $0 < x < \frac{1}{3}$ 时, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减, 当 $x > \frac{1}{3}$ 时, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增,

所以 $t = \varphi(x) \geq \varphi\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \ln \frac{1}{3} = \ln 3e$,9 分

令 $g(x) = e^x - x - 1$, 则 $g'(x) = e^x - 1$

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 所以 $g(x) > g(0) = 0$

因此 $g(3x - \ln x) > g(0) = 0$,11 分

所以 $e^{3x - \ln x} - 1 > 3x - \ln x$ 从而 $e^{3x} - x - 3x^2 + x \ln x > 0$,

所以当 $a \geq 1$ 时 $f(x) > h(x)$ 恒成立.....12 分

22. (1) 令 $x=0$, 则 $t^2 - 2t - 3=0$, 解得 $t=-1$ (舍) 或 $t=3$, 则 $y=-4$, 即 $A(0, -4)$...2 分

令 $y=0$, 则 $-t^2 + t + 2=0$, 解得 $t=2$ 或 $t=-1$ (舍), 则 $x=-3$, 即 $B(-3, 0)$4 分

$\therefore S = \frac{1}{2}|OA||OB| = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$;5 分

(2) 由 (1) 可知圆心坐标为 $\left(-\frac{3}{2}, -2\right)$, 半径为 $\frac{\sqrt{(0+3)^2 + (0+4)^2}}{2} = \frac{5}{2}$

则以 AB 为直径的圆的方程为 $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + (y+2)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$,

即 $x^2 + 3x + y^2 + 4y = 0$8 分

由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 可得, 以 AB 为直径的圆的极坐标方程为 $\rho + 3 \cos \theta + 4 \sin \theta = 0$.

.....10 分

23. (1) 由题知, 当 $m=1$ 时, 原不等式即 $|x+1|+|x-2|\leq 5$,1 分
- 当 $x\leq -1$ 时, 不等式为 $-x-1-x+2\leq 5$, 解得 $-2\leq x\leq -1$;2 分
- 当 $-1<x<2$ 时, 不等式为 $x+1-x+2\leq 5$, 恒成立;3 分
- 当 $x\geq 2$ 时, 不等式为 $x+1+x-2\leq 5$, 解得 $2\leq x\leq 3$,4 分
- 综上, 不等式 $f(x)\leq 5$ 的解集为 $\{x|-2\leq x\leq 3\}$;5 分
- (2) 因为 $|x+m|+|x-2m|\geq|x+m-x+2m|=|3m|$,
- 当且仅当 $(x+m)(x-2m)\leq 0$ 时不等式取等号, 即 $f(x)_{\min}=|3m|$,8 分
- 所以 $|3m|>1-m$, 解得 $m<-\frac{1}{2}$ 或 $m>\frac{1}{4}$,
- 所以 m 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$10 分